L'Abeille de la Nouvelle-Orléans.

BUREAUX : rue de Chartres No. 73. NOUVELLE-ORLEANS, MERCREDI MATIN, 15 JANVIER 1890. 63me Année

L'Abeille de la Nouvelle-Orléans.

Bureaux : 73 rue de Chartres.

Editeur & Gérant,
Propriétaires-Editeurs.

Entered at the Post Office at New Orleans, La., as Second Class Matter.

NOUVELLE-ORLEANS.
MERCREDI, 15 JANVIER 1890.

PRIX DE L'ABONNEMENT.

EDITION QUOTIDIENNE.

Un an	$12 00
Six mois	6 00
Trois mois	3 00
Un mois	1 00

On s'abonne aussi, à la semaine, avec les porteurs.

EDITION DU DIMANCHE.

Un an	$3 00

EDITION HEBDOMADAIRE.

Un an	$3 00
Six mois	1 50
Quatre mois	1 00
Trois mois	75

☞ Pour les petites annonces de Demandes Ventes et Locations, etc., qui se soldent au prix réduit de 10 cts la ligne, voir la 3e page.

L'INFLUENZA.

La *Semaine médicale*, de Paris, rend compte, en ces termes, d'une discussion qui s'est produite à la dernière séance de la Société de médecine interne de Berlin, au sujet de l'influenza.

Aucune question ne préoccupait davantage le public à cette heure, nous croyons devoir reproduire les opinions exprimées par les médecins allemands :

M. Senator donne, d'abord, un aperçu historique des différentes épidémies d'influenza qui ont jusqu'ici envahi l'Europe. L'orateur insiste surtout sur l'épidémie qui sévit en Europe en 1833 et dont la mortalité, causée par des pneumonies consécutives, fut plus grande qu'à l'ordinaire. Ces épidémies d'influenza se propagent, pour ainsi dire, par bonds et s'éteignent ordinairement au bout de six semaine. Cette maladie a des caractères infectieux; mais on ne sait encore si elle est d'origine miasmatique et M. Hirsh a fait mention d'une épidémie qui aurait éclaté à bord d'un vaisseau à destination de la Chine et qui avait quitté déjà depuis plusieurs semaines un port européen ; l'influenza envahit l'équipage en pleine mer, mais en abordant Canton, tous les malades se rétablirent, bien que la Canton la même épidémie régnât dans la population au moment où elle frappait l'équipage du navire. Il semble donc qu'il ne s'agit pas d'un miasme développé localement, mais plutôt d'un virus ubiquiste qui naît et meurt à la même époque sur des points du globe très différents.

Nous avons à Berlin, depuis le mois dernier, une épidémie d'influenza qui, venant de l'est (Pétersbourg), s'est propagée dans toute la ville et n'a épargné aucune classe de la population. L'examen des différents cas entrés à l'hôpital de la Charité montre qu'il existe trois formes d'influenza :

1. La maladie se manifeste rapidement comme la foudre. L'individu en bonne santé est tout d'un coup pris de maux de tête, de vertiges, d'une fièvre fort prononcée (température de 40 à 41 degrés) ; les yeux sont injectés, il y a de la constipation, l'appétit fait défaut, il n'y a pas de sommeil. Au bout de 10 à 12 heures, une toux se manifeste et, au bout de 24 heures, le processus pathologique atteint son plein développement. Les malades ressentent, paraît-il, et tous ont eu une température normale dès le quatrième jour. Si le répète, c'étaient les cas les plus graves.

M. Kalischer.—Parmi les symptômes, je place en première ligne le frisson initial qui n'a fait défaut chez aucun de mes malades ; j'ai observé aussi de l'insomnie, surtout le deuxième et le troisième jour, de sorte que la maladie est contagieuse. J'ai vu souvent un enfant attraper la maladie à l'école, et le communiquer ensuite à tous les autres membres de sa famille. Je m'étonne beaucoup que les autorités de la ville aient hésité à fermer les écoles, et je propose de voter une résolution tendant à ce que cette fermeture ait lieu.

M. Leyden.—L'épidémie de grippe ou d'influenza a éclaté vers la fin du mois de novembre à Berlin. Elle a augmenté rapidement au commencement de décembre et semble ne pas encore avoir déposé ses armes ; passé l'épidémie va-t-elle disparaître complétement ; en tout cas, actuellement, le nombre des personnes atteintes est considérable. Il n'a pas été possible, toutefois, d'en fixer exactement le chiffre, car les statistiques exactes font défaut ; mais les médecins estiment que l'épidémie a frappé à peu près le quart ou le cinquième de la population berlinoise.

L'épidémie a régné dans toutes les parties de la ville ; toutefois, elle a sévi principalement au sud et à l'ouest ; le nord et le nord-ouest ont été moins affectés.

L'épidémie a attaqué les deux sexes et frappé tous les âges ; toutes les professions, toutes les classes de la société, sans que l'on ait observé de différences à ce sujet.

Les symptômes de cette grippe sont bien typiques. L'homme, en pleine santé, est tout d'un coup saisi de frissons, de lassitude générale, de maux de tête, d'abattement et de prostration ; souvent on observe des nausées avec des vomissements et une fièvre intense rapide de la température. Les malades souffrent des yeux et surtout de photophobie. La convalescence se traîne pendant deux ou trois jours, la marche est ordinairement assez facile à cette époque, mais les malades se sentent le plus souvent très faibles. Il est à remarquer que, dans la même famille, plusieurs personnes sont atteintes en même temps, que les malades se rétablissent, bien que la maladie ne soit pas encore éteinte, et que les malades ne semblent le plus souvent pas contagieux.

Les points de vue du traitement, l'antipyrine n'est montée en faveur.

M. Turbiner.—On ne peut pas méconnaître qu'il s'agit de l'influenza. La grande prostration, qui n'est nullement en rapport avec les troubles locaux, frappait tout d'abord la saine intelligence de la maladie. On pourrait croire qu'il s'agit d'une fièvre typhoïde, mais l'abaissement de la température dès le second ou le troisième jour ferait bientôt reconnaître l'erreur. Puis, on pourrait peut-être confondre une pneumonie avec l'influenza, car dans cette maladie on observe parfois quelques crachats un peu sanguinolents (consécutifs à une broncho-pneumonie concomitante abortive). Deux fois seulement j'ai observé une véritable pneumonie comme complication de l'influenza.

Quant au traitement, je ne préconise aucun médicament. Il n'y a pas d'agent thérapeutique qui agisse directement sur le virus infectant. Aux quarante-cept malades du Friedrichshain, on n'a rien administré, et tous ont eu une température normale dès le quatrième jour. Est-ce hâtif, c'étaient les cas les plus graves.

M. Kalischer.—Parmi les symptômes, je place en première ligne le frisson initial qui n'a fait défaut chez aucun de mes malades ; j'ai observé aussi de l'insomnie, surtout le deuxième et le troisième jour, de sorte que la maladie est contagieuse. J'ai vu souvent un enfant attraper la maladie à l'école, et le communiquer ensuite à tous les autres membres de sa famille. Je m'étonne beaucoup que les autorités de la ville aient hésité à fermer les écoles, et je propose de voter une résolution tendant à ce que cette fermeture ait lieu.

M. Leyden.—L'épidémie de grippe ou d'influenza a éclaté vers la fin du mois de novembre à Berlin. Elle a augmenté rapidement au commencement de décembre et semble ne pas encore avoir déposé ses armes ; passé l'épidémie va-t-elle disparaître complétement ; en tout cas, actuellement, le nombre des personnes atteintes est considérable. Il n'a pas été possible, toutefois, d'en fixer exactement le chiffre, car les statistiques exactes font défaut ; mais les médecins estiment que l'épidémie a frappé à peu près le quart ou le cinquième de la population berlinoise.

L'épidémie a régné dans toutes les parties de la ville ; toutefois, elle a sévi principalement au sud et à l'ouest ; le nord et le nord-ouest ont été moins affectés.

L'épidémie a attaqué les deux sexes et frappé tous les âges ; toutes les professions, toutes les classes de la société, sans que l'on ait observé de différences à ce sujet.

Les symptômes de cette grippe sont bien typiques. L'homme, en pleine santé, est tout d'un coup saisi de frissons, de lassitude générale, de maux de tête, d'abattement et de prostration ; souvent on observe des nausées avec des vomissements et une fièvre intense rapide de la température. Les malades souffrent des yeux et surtout de photophobie. La convalescence se traîne pendant deux ou trois jours, la marche est ordinairement assez facile à cette époque, mais les malades se sentent le plus souvent très faibles. Il est à remarquer que, dans la même famille, plusieurs personnes sont atteintes en même temps, que les malades se rétablissent, bien que la maladie ne soit pas encore éteinte, et que les malades ne semblent le plus souvent pas contagieux.

Les points de vue du traitement, l'antipyrine n'est montée en faveur